

เกณฑ์การตัดสินใจให้บริจาคโลหิตสำหรับการใช้ยาต่าง ๆ

1. Allergy and anti-allergy drugs (โรคภูมิแพ้และยาแก้แพ้)

รับบริจาคโลหิตได้	ถ้าในวันที่จะบริจาคโลหิต ไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และผู้บริจาครู้สึกสบายดี สามารถบริจาคโลหิตได้
ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว	หากมีการใช้ steroids ร่วมด้วย ทั้งชนิดรับประทานและฉีดในการรักษา ให้หยุดใช้ยา steroids ก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์จึงจะสามารถบริจาคได้

2. Anti-acne (ยารักษาสิว)

2.1 Antibiotics (ยาปฏิชีวนะ) ที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีสิว ได้แก่ tetracycline clindamycin minocycline doxycycline erythromycin lymecycline หรือ oxytetracycline เป็นต้น

รับบริจาคโลหิตได้	ในกรณีเป็นสิ่วที่ไม่มีการอักเสบ แต่มีการใช้ยาทั้งชนิดรับประทานและ/หรือทาผิวหนึ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว	หากอยู่ระหว่างใช้ยาเพื่อรักษาภาวะอักเสบของสิ่ว ต้องรอจนกว่าการอักเสบหายดีแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์และใช้น้ำนี้ครบ course มาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงจะบริจาคโลหิตได้

2.2 Retinoids (กลุ่มอนุพันธ์วิตามิน เอ)

ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว	ต้องหยุดยาก่อนการบริจาค เนื่องจากยาในกลุ่มนี้มีผลทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ - Isotretinoin (Roaccutane®) ต้องหยุดก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 1 เดือน - Acitretin (Neotigason®) ต้องหยุดก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 2 ปี
ไม่รับบริจาคโลหิตถาวร	กรณีที่เคยใช้ยา etretinate (Tigason®)

3. Anti-anxiety agents antidepressants and hypnotic agents

(ยาคลายกังวล ยารักษาอาการซึมเศร้า และยานอนหลับ)

รับบริจาคโลหิตได้	เมื่อรับประทานยามาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ไม่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาและไม่มีอาการของโรค เช่น อาการกังวล (over-anxiety) อาการซึมเศร้า (depressed) อารมณ์ดีหรือคึกคักมากกว่าปกติ (mania) หรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar) เป็นต้น
-------------------	--

4. Anti-arthritis (การรักษาโรคข้ออักเสบ)

- | | |
|---------------------------|--|
| รับบริจาคโลหิตได้ | <ul style="list-style-type: none"> - หากไม่มีอาการของโรค - กรณีที่ใช้ยาในกลุ่ม anti-inflammatory/NSAIDs ให้ใช้ได้เฉพาะเมื่อดเลือดแดง |
| ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว | <ul style="list-style-type: none"> - หากมีการใช้ยา steroids ให้ดูข้อ 29 หน้า 80 - หากมีการรักษาด้วย gold therapy ต้องสิ้นสุดการรักษามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือนก่อนการบริจาคโลหิต |

5. Antibiotics (ยาปฏิชีวนะ) กรณีป้องกันการติดเชื้อในภาวะอื่น ๆ รวมทั้งใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ

- | | |
|---------------------------|--|
| รับบริจาคโลหิตได้ | <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับทันตกรรม เช่น โรคปริทันต์อักเสบหรือก่อนการทำทันตกรรมอื่น ๆ - เมื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในโรคต่าง ๆ เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น |
| ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว | <p>การใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ ต้องมีระยะหยุดยามาแล้วดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ต้องหยุดยามาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้ - หากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ต้องหยุดยามาอย่างน้อย 10 วัน จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้ - หากเคยมีการติดเชื้อหนองในเทียม (chlamydia) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องสิ้นสุดการรักษาอย่างน้อย 5 วันและหายจากโรคมานานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ |

6. Anticoagulation agents (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด)

- | | |
|-------------------|--|
| ไม่รับบริจาคโลหิต | <p>หากผู้บริจาคโลหิตอยู่ในระหว่างการให้ยาในกลุ่ม anticoagulation agents ให้งดบริจาคโลหิต ตัวอย่างยา เช่น warfarin (Befarin[®]) heparin (HEP-25[®]) enoxaparin (Clexane[®]) fondaparinux (Arixtra[®]) หรือ dabigatran (Pradaxa[®])</p> |
|-------------------|--|

7. Anticonvulsants (ยากันชัก)

- | | |
|---------------------------|---|
| ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว | <p>เมื่อไม่มีอาการชัก สามารถหยุดยาได้อย่างน้อย 3 ปี และมีใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษามายืนยัน จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้</p> |
|---------------------------|---|

8. Anti-diabetic agents (ยารักษาโรคเบาหวาน)

8.1 Insulin (ยาฉีดอินซูลิน)

ไม่รับบริจาคโลหิตถาวร

8.2 Oral medication (ยาชนิดรับประทาน)

รับบริจาคโลหิตได้

- หากใช้การควบคุมระดับน้ำตาลด้วยยารับประทาน โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น
- หากเป็นผู้ที่เคยมีประวัติระดับน้ำตาลในเลือดสูงในบางช่วง ได้แก่ เบาหวานในภาวะตั้งครรรภ์ หรือ pre-diabetes (abnormal blood sugar) เมื่อระดับน้ำตาลกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วสามารถบริจาคโลหิตได้

9. Antifungals (ยาต้านเชื้อรา)

รับบริจาคโลหิตได้

กรณีที่เป็นยาทา

ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว

กรณีที่เป็นยารับประทานต้องหยุดยาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนบริจาคโลหิต

10. Anti-gout agents (ยารักษาโรคเกาต์)

รับบริจาคโลหิตได้

- หากไม่มีอาการของโรค
- กรณีที่ใช้ยากลุ่ม anti-inflammatory/NSAIDs ให้ใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง
- หากมีการใช้ยา steroids ให้ดูข้อ 29 หน้า 80

11. Antihypertensive agents (ยาลดความดันโลหิต)

รับบริจาคโลหิตได้

โดยที่ไม่ต้องพิจารณาชนิดของยาที่ใช้ ให้พิจารณาจากระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ โดย systolic ไม่มากกว่า 160 mmHg และ diastolic ไม่มากกว่า 100 mmHg และต้องปราศจากภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจหรือมีการทำงานของไตบกพร่อง เป็นต้น

12. Antimalarial agents (ยาต้านมาลาเรีย)

ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว

- หากใช้ยาต้านมาลาเรียเพื่อรักษา ต้องหายจากโรคและหยุดใช้ยาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้
- หากใช้ยาต้านมาลาเรียเพื่อป้องกัน ไม่ต้องพิจารณาชนิดของยาที่ใช้ ให้พิจารณาจากสถานที่ที่เดินทาง/ที่อยู่ และหากมีการเดินทาง/อาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีการระบาด ให้เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังกลับจากสถานที่นั้น

13. Antiplatelet drugs (ยาต้านเกล็ดเลือด)

รับบริจาคโลหิตได้	- ถ้าไม่ได้หยุดยา สามารถบริจาคโลหิตได้แต่นำไปใช้ได้เฉพาะ เม็ดเลือดแดง
ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว	- หากต้องการบริจาคเกล็ดเลือดให้พิจารณาจากชนิดยาที่รับประทาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● Piroxicam (Feldene[®]) และ aspirin (Aspilets[®]) ต้องหยุดยาลอย่างน้อย 2 วันก่อนบริจาคโลหิต ● Prasugrel (Effient[®]) ต้องหยุดยาลอย่างน้อย 3 วันก่อนบริจาคโลหิต ● Ticagrelor (Brilinta[®]) ต้องหยุดยาลอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนบริจาคโลหิต ● Clopidogrel (Plavix[®]) และ ticlopidine (Ticlid[®]) ต้องหยุดยาลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนบริจาคโลหิต ● Vorapaxar (Zontivity[®]) ต้องหยุดยาลอย่างน้อย 1 เดือนก่อนบริจาคโลหิต

14. Anti-psychotic agents (ยารักษาโรคจิตเภท)

ไม่รับบริจาคโลหิต	เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตจำเป็นต้องรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง และอาจไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ขณะบริจาคโลหิต
-------------------	---

15. Aspirin and NSAIDs ที่นอกเหนือจากการใช้ใน arthritis

ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว	- รับประทานยาแอสไพริน ยากลุ่ม NSAIDs ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน ไม่ต้องงด สามารถบริจาคโลหิตได้ แต่ต้องไม่นำโลหิตนั้นไปปั่นทำเกล็ดเลือด หากต้องการบริจาคโลหิตเพื่อไปทำเกล็ดเลือดไม่ว่าด้วยวิธีปั่นแยกธรรมดาหรือ plateletpheresis ต้องหยุดรับประทานยามาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
	- ส่วนยาคลายกล้ามเนื้อ ส่วนมากจะเป็นยาผสมหลายชนิด หากเป็นยาที่ไม่มี NSAIDs ผสมอยู่ สามารถบริจาคโลหิตได้ตามปกติ

16. Bronchodilators and decongestants (ยาขยายหลอดลมและยาลดอาการคัดจมูก)

- | | |
|-------------------|---|
| รับบริจาคโลหิตได้ | - เมื่อไม่มีอาการของโรคหรือมีอาการน้อย สามารถควบคุมได้
โดยใช้ยา steroids ชนิดพ่นเท่านั้น |
| ไม่รับบริจาคโลหิต | - หากยังมีอาการของโรคที่ต้องควบคุมโดยใช้ steroids
ชนิดรับประทานหรือฉีด |

17. Contraceptive agents (ยาคุมกำเนิด)

- | | |
|-------------------|---|
| รับบริจาคโลหิตได้ | รับบริจาคโลหิตทุกรูปแบบของการใช้ยา และต้องไม่มีอาการ
แทรกซ้อนในกรณีที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฝังหรือชนิดฉีด |
|-------------------|---|

18. Dermatological diseases (ยารักษาโรคผิวหนัง)

- | | |
|-------------------|--|
| รับบริจาคโลหิตได้ | เมื่อผิวหนังไม่มีรอยโรคที่ส่งผลต่อการเจาะเก็บโลหิต ไม่มีการติดเชื้อ
ไม่มีอาการทางระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (systemic symptoms) หรืออาการแทรกซ้อนอื่น ๆ และไม่ได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive) หรือยาในกลุ่มอนุพันธ์
วิตามิน เอ (retinoids) ร่วมด้วย |
| ไม่รับบริจาคโลหิต | เมื่อผู้บริจาคโลหิตเป็นโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ
ของร่างกาย (systemic disease) เช่น scleroderma SLE
dermatomyositis และ systemic cutaneous amyloidosis |

19. Dieting (ควบคุมอาหาร)

- | | |
|-------------------|---|
| รับบริจาคโลหิตได้ | เมื่อผู้บริจาคโลหิตมีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป และไม่มี
อาการข้างเคียงจากการลดน้ำหนักด้วยวิธีต่าง ๆ และน้ำหนัก
คงที่ 2 สัปดาห์ |
|-------------------|---|

20. Eye preparations (ยาตา)

- | | |
|-------------------|--|
| รับบริจาคโลหิตได้ | ทั้งชนิดรูปแบบยาหยอดตาและยาป้ายตา |
| ไม่รับบริจาคโลหิต | หากพบการติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษา |

21. Gastrointestinal medications (ยาที่ใช้ในโรกระบบทางเดินอาหาร)

- | | |
|-------------------|---|
| รับบริจาคโลหิตได้ | - เมื่อสามารถควบคุมอาการได้ ไม่อยู่ในระหว่างการหาสาเหตุ
ของโรคกระเพาะอาหาร ไม่ได้วางแผนในการรักษาด้วยวิธีการ
ผ่าตัด |
| | - กรณีตรวจส่องกล้องโดยไม่มีการผ่าตัดหรือดมยาสลับ
ให้งดบริจาคโลหิตอย่างน้อย 1 เดือน แต่หากมีการเก็บชิ้นเนื้อ
ไปตรวจด้วย ต้องงดบริจาคจนกว่าจะทราบผลตรวจชิ้นเนื้อ
แล้วว่าปกติ |

22. Hair loss treatment medicines (ยารักษาโรคผมร่วงและผมบาง)

- ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว**
- กรณีที่ใช้ยาฆ่าเชื้อรา (antifungal) ต้องรักษาหายไม่มีอาการแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการใช้ shampoos หรือ lotions ที่มียาฆ่าเชื้อราอยู่ด้วย
 - Finasteride ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
 - Dutasteride ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
 - ถ้าใช้ยา steroids ในกรณีนี้ซึ่งต้องใช้เป็นระยะเวลานาน ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน

23. Heart disease and medications (โรคหัวใจและยารักษาโรคหัวใจ)

- ไม่รับบริจาคโลหิต**
- เมื่อเป็นโรคหัวใจทุกชนิด ได้แก่ angina pectoris atrial fibrillation atrial flutter atrial tachycardia AV-block เป็นต้น เนื่องจากอาจทำให้ผู้บริจาคโลหิตอาการกำเริบหรือทรุดลงได้ในขณะที่กำลังบริจาคโลหิต
 - ในกรณีที่ทำให้เกิดการเพื่อรักษาโรคหัวใจ เช่น bypass หรือ balloon แล้วต้องใช้นี้เป็นประจำ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแก่ผู้บริจาคโลหิตได้

24. HIV prevention regimen (ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เช่น PrEP, PEP เป็นต้น)

- ไม่รับบริจาคโลหิตถาวร**
- เนื่องจากยากกลุ่มนี้ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อเอชไอวีได้หมด เพียงแต่ลดปริมาณของเชื้อจนถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้แม้จะใช้เทคนิค NAT แล้วก็ตาม แต่ยังสามารถถ่ายทอดเชื้อผ่านทางโลหิตได้ และยาอาจรบกวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้

25. Hormones (ฮอร์โมน)

- รับบริจาคโลหิตได้**
- กรณีที่ใช้ hormone replacement therapy (HRT) สำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือนเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน เป็นการให้ฮอร์โมนขนาดต่ำ (low dose) เพื่อทดแทนปริมาณฮอร์โมนให้อยู่ในระดับปกติ
 - กรณีที่ใช้ฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroxine) เพื่อทดแทนในภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ รับบริจาคโลหิตได้ ถ้าได้รับประทานยาต่อเนื่องมาอย่างน้อย 8 สัปดาห์และไม่มีการปรับขนาดยาในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ไม่รับบริจาคโลหิต

หมายเหตุ กรณีที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษ (hyperthyroidism) ให้ศึกษารายละเอียดในขั้นตอนที่ 4 หน้า 16

กรณีที่ใช้ testosterone replacement therapy (TRT) ในกรณีชายข้ามเพศ (transgender man หมายถึง ผู้ที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิง) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

- (1) ผู้บริจาคโลหิตใช้ฮอร์โมนนี้ในระดับสูงและต่อเนื่อง เมื่อนำโลหิตไปใช้กับหญิงตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดการพิการของทารกในครรภ์ (birth defect) และอาจมีผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก
- (2) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด TRALI (transfusion-related acute lung injury) เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเคยตั้งครรภ์มาก่อน อาจมีโอกาสสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด (anti-HLA, anti-neutrophil, anti-platelet)

หมายเหตุ หากธนาคารเลือดใด ต้องการรับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ใช้ testosterone replacement therapy (TRT) ในกรณีชายข้ามเพศ (transgender man) สามารถทำได้ แต่แนะนำให้นำไปใช้เฉพาะเม็ดเลือดแดงเท่านั้น

ในกรณีของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ไม่รับ เนื่องจากถ้ามีการบริจาคโลหิตหลายประเภทจะทำให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความซับซ้อนอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ ได้

26. Immunization (วัคซีน)			
ลำดับ	รายการยา	การบริจาคโลหิต	คำอธิบายเพิ่มเติม
26.1	Anthrax vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.2	Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน และไม่มีอาการข้างเคียง
26.3	Chicken pox and live shingles (live zoster) vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน และไม่มีอาการข้างเคียง
26.4	COVID-19 vaccine - Inactivated vaccine เช่น Sinovac, Sinopharm - mRNA vaccine เช่น Pfizer/BioNTech, Moderna - Viral vector vaccine เช่น AstraZeneca, Johnson & Johnson	งดชั่วคราว	กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย. - เว้น 7 วันหลังฉีดวัคซีน กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน - เว้น 7 - 14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ หมายเหตุ ให้ติดตามข้อมูลจากประกาศฉบับล่าสุดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจพบได้ ได้แก่ - มีไข้ หนาวสั่น - ปวดศีรษะ - อ่อนเพลีย - บวมแดงบริเวณที่ฉีด - คลื่นไส้ อาเจียน - ปวดเมื่อยตัว
26.5	Diphtheria vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.6	Diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.7	German measles (Rubella) vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.8	Hepatitis A vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.9	Hepatitis B immunoglobulin (HBIG)	งดชั่วคราว	เว้น 12 เดือน หลังจากได้รับ immunoglobulin เมื่อสัมผัสโรค

ลำดับ	รายการยา	การบริจาคโลหิต	คำอธิบายเพิ่มเติม
26.10	Hepatitis B vaccine	งดชั่วคราว	กรณีที่ต้องฉีดเพื่อป้องกัน รอ 21 วันเป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.11	Herpes zoster (Shingles) vaccine		
	- Shingrix™	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
	- Zostavax™	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
	- กรณีไม่ทราบชื่อวัคซีน	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.12	Human papilloma virus (HPV) vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.13	Human rabies immunoglobulin (HRIG) หรือ equine rabies immunoglobulin (ERIG)	งดชั่วคราว	เว้น 12 เดือน หลังจากได้รับ immunoglobulin เมื่อสัมผัสสัตว์ ถ้าสุนัข แมวกัด ให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริจาคได้ถ้าแผลหาย 2. ถ้ากินยาฆ่าเชื้อให้งด 1 สัปดาห์ตามเกณฑ์การใช้ยา 3. ให้งด 12 เดือน ถ้ามีการฉีดยา HRIG หรือ ERIG เข้าไปที่แผล
26.14	Influenza vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.15	Japanese encephalitis vaccine		
	- Inactivated virus	รับ	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
	- Live attenuated virus	งดชั่วคราว	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.16	Measles (Red measles, Rubeola) vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.17	Measles mumps and rubella (MMR) vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.18	Meningitis vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน

ลำดับ	รายการยา	การบริจาคโลหิต	คำอธิบายเพิ่มเติม
26.19	Mumps vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.20	Pneumococcal vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.21	Poliomyelitis vaccine		
	- IPV (Inactivated poliomyelitis, injection)	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
	- OPV (Oral poliomyelitis)	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.22	Rabies vaccine ใช้ในกรณีป้องกันหรือสัมผัสเชื้อ	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนและบาดแผลจากการถูกสัตว์กัดตายแล้ว
26.23	Rocky mountain spotted fever vaccine	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.24	Smallpox vaccine	งดชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> - หลังได้รับยามาแล้วอย่างน้อย 8 สัปดาห์ และไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน เช่น อาการทางผิวหนัง - หากมีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน ต้องเว้น 2 สัปดาห์หลังจากที่อาการข้างเคียงหายดีแล้ว จึงจะรับบริจาค - หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับวัคซีนและมีอาการข้างเคียง ต้องเว้นอย่างน้อย 8 สัปดาห์ หลังจาก lesion แรกปรากฏ
26.25	Tetanus immunoglobulin	งดชั่วคราว	เว้น 12 เดือน หลังจากได้รับ immunoglobulin เมื่อสัมผัสโรค
26.26	Tetanus vaccine		
	- Killed bacteria	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
	- Toxoid	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน

ลำดับ	รายการยา	การบริจาดโลหิต	คำอธิบายเพิ่มเติม
26.27	Typhoid vaccine		
	- Killed bacteria	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
	- Live attenuated	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
	- Oral	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน
26.28	Yellow fever vaccine	งดชั่วคราว	รอ 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลังได้รับวัคซีน

27. Lipid lowering agents (ยาลดไขมันในเลือด)

รับบริจาดโลหิตได้ หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (coronary artery disease) โรคหลอดเลือดในสมองตีบ เป็นต้น

28. Mild analgesics and muscle relaxants (ยาแก้ปวดมีฤทธิ์อ่อนและยาคลายกล้ามเนื้อ)

รับบริจาดโลหิตได้ เมื่อผู้บริจาดโลหิตรู้สึกว่าการไม่ได้กระทบต่อกิจวัตรประจำวัน หรือผู้บริจาดโลหิตสามารถขึ้นลงจากเตียงบริจาดโลหิตได้เอง

29. Steroids (สเตียรอยด์)

ไม่รับบริจาดโลหิตชั่วคราว

- ต้องงดยามาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์หากใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันน้อยกว่า 3 สัปดาห์
- ต้องงดยามาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนหากใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน
- ต้องงดยามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือนหากใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
- งดบริจาดอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่เคยฉีด steroids หรือยาอื่นใดที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ เนื่องจาก อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ทางโลหิต โดยเฉพาะ HIV หรือไวรัสตับอักเสบบี และซี

หมายเหตุ: พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 1 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาโรคภูมิแพ้ (allergy)
 พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 4 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาโรคข้อ (arthritis)
 พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 5 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาโรคเกาต์ (gout)
 พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 15 ในกรณีที่ใช้ steroids ในโรคหืด (asthma)
 พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 22 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาผมร่วง (hair loss)

30. Vitamins and dietary supplements (วิตามินและอาหารเสริมต่าง ๆ)

รับบริจาคโลหิตได้

- กรณีที่ใช้วิตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรืออาหารเสริมนั้น เป็นไปเพื่อบำรุงร่างกายต้องไม่ใช่เพื่อรักษาโรค เช่น การรับประทานวิตามิน ซี เพื่อป้องกันการเป็นหวัดหรือใช้ร่วมกับยาธาตุเหล็กเพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กหรือการใช้ glucosamine sulfate เพื่อบำรุงข้อ
- กรณีที่ใช้น้ำมันปลา (fish oil) หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไขมันชั้น ให้ใช้เฉพาะเม็ดเลือดแดง ไม่นำโลหิตบริจาคขึ้นไปเตรียมเป็นเกล็ดเลือด หากต้องการบริจาคเกล็ดเลือดทุกวิธี ต้องหยุดรับประทานอย่างน้อย 3 วันก่อนบริจาค

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้บริจาคโลหิตรับประทานอาหารเสริมที่มีไบโอติน (biotin) อาจรบกวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจชนิด immunoassays ทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้ หากน้ำยาที่ใช้ตรวจระบุว่า biotin ไม่มีผลต่อการทดสอบ สามารถให้บริจาคได้ตามปกติโดยไม่ต้องเว้นการรับประทาน **ทั้งนี้** ห้องปฏิบัติการต้องประสานแจ้งให้หน่วยงานรับบริจาคโลหิตทราบ

31. Others (อื่น ๆ)

31.1 การเสริมความงาม เช่น botox collagen ชนิดฉีด การสักทุกชนิด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้อุปกรณ์เจาะผ่านผิวหนัง

รับบริจาคโลหิตได้

เมื่อกระทำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อที่โรงพยาบาลเท่านั้น

ไม่รับบริจาคโลหิตชั่วคราว

- หากทำหัตถการ ณ สถานที่อื่น ๆ ควรเว้นอย่างน้อย 4 เดือน เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ทางโลหิต โดยเฉพาะ HIV หรือไวรัสตับอักเสบบี และซี โดยมีเงื่อนไขว่าการตรวจ HCV ในโลหิตบริจาคใช้เทคนิค NAT
- สำหรับการตรวจ HCV ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ใช้เทคนิค NAT จึงให้เว้น 4 เดือนแทนเกณฑ์เดิมที่ให้เว้น 1 ปี
- ถ้าไม่ได้ตรวจ HCV ด้วยเทคนิค NAT หรือไม่มั่นใจในสถานที่ที่ไปรับบริการให้เว้น 1 ปี

31.2 Methylphenidate (Ritalin®)

รับบริจาคโลหิตได้

เป็นยารักษาโรคสมาธิสั้น หากสามารถควบคุมอาการได้โดยการใช้นี้ตามคำสั่งแพทย์

- หากมีข้อสงสัยในการตัดสินใจคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ให้ปรึกษาแพทย์ผู้รับผิดชอบธนาคารเลือด -

ภาคผนวก

รายการยาในแต่ละกลุ่ม ชื่อสามัญและชื่อการค้า

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
1. Allergy and anti-allergy drugs (โรคภูมิแพ้และยาแก้แพ้)	
Brompheniramine maleate	Bromphen, Bromamine
Cetirizine	Cerax, Cetihis, Cetrimed, Cetrine, Cetrizet, Cetrizin, Ceza, Cistamine, Cyzine, Fatec, Histica, Incidal-OD Cetirizine, Setin, Sutac, Terzine, Triz, Zensil, Zermed, Zertine, Zyrac, Zyrazine, Zyrcon, Zyrex, Zyrtec
Chlorpheniramine maleate	Chlorleate, Chlorpheno, chlorpyrimine, Cohistan, Histatapp, Kloramin, Piriton
Cyproheptadine	Cyprono, Periactin
Desloratadine	Aerius
Dimethindene maleate	Fenistil
Diphenhydramine	Benadryl
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Abacus, Atano, Atarax, Cerax, Drazine, Hadarax, Histan, Hizin, Hydroxin, Masarax, Postarax, R-RAX, Taraxin, Trandrozine, Unamine,
Loratadine	Aller-Tab, Allerdine, Allersil, Clarid, Clarityne, Halodin, Lindine, Loradine, Loranox, Lordin, Lorita, Lorsedin, Lortadine, Ridamin, Rityne, Roletra, Tiradine, Tirlor
Mebhydrolin napadisylate	Dayhist, Posidol
Oxatomide	Tinset
Piprinhydrate	Plokon
Promethazine	Phenergan, Titanox
2. Anti-acne (ยารักษาสิว)	
2.1 Antibiotics (ยาปฏิชีวนะ)	
Clindamycin	Acnocin, Clindavid, Klinna, Clinott, Rosil, Todacin
Doxycycline	Doxycom, Doxylcap, Doxyclyne, Vibramycin
Erythromycin	Erycin, Tomcin, Rintacap, E S Cap, Erimycin

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Lymecycline	Tetralysal
Minocycline	Minocin, Acnamino
Oxytetracycline	Oxycine, O-Tetra, Oxycide, Oxynutra
2.2 Retinoids (กลุ่มอนุพันธ์วิตามิน เอ)	
Acitretin	Neotigason
Etretinate	Tigason
Isotretinoin	Roaccutane, Acnotin, Sotret, Isotane, Acnotin, A-Cnotren, Isotrex, Proacne-10, Tinoin, Retacnyl
3. Anti-anxiety agents antidepressants and hypnotic agents (ยาคลายกังวล ยารักษาอาการซึมเศร้า และยานอนหลับ)	
Clorazepate	Anxielax, Cloramed, Cloraxene 5, Diposef, Dipot, Flulium, Manotran, Polizep, Pomadom, Posene, Sanor, Serene, Trancap, Tranclor, Trancon, Tranxene, Zetran-5
Desvenlafaxine	Pristiq, Pristig
Diazepam	Azepam, Diano, Diapam, Diapine, Dizan, Dizepam, Sipam, Stesolid, Valium, Zopam
Dothiepin	Prothiaden
Escitalopram	Lexapro
Ethyl loflazepate	Victan
Flunitrazepam	Rohypnol
Fluoxetine	Anzac, ATD-20, Deproxin, Flumed, Fluoxetine, Flusac, Flutine, Fluxetil, Fluoxetine Atlantic, Fluzac-20, Loxetine-20, Magrilan, Oxetine 20, Oxsac, Prodep, Unprozy
Flupentixol	Fluanxol
Flupentixol + Melitracen	Deanxit
Flurazepam	Dalmadorm
Fluvoxamine	Faverin, Fluvoxin
Haloperidol	H-TAB, Haldol, Halomed, Halopol, Haricon, Haridol, Perida, Polyhadon, Tensidol
Hydroxyzine	Atarax, Histan, Honsa, Hydroxin
Imipramine	Celamine, Sermonil, Topramine

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Lamotrigine	Lamictal
Lithium carbonate	Licarb, Limed, Lit 300, Phanate, Eskalith
Lorazepam	Anta, Anxira, Ativan, Lonza, Lora, Loramed, Lorapam, Lorazep, Lorazepam Macrophar, Ora, Razepam
Maprotiline	Ludiomil
Mianserin	Mealin, Mianserin Remedica, Ornate, Servin, Tolimed, Tolvol
Midazolam	Dormicum, Midazol
Mirtazapine	Remeron
Moclobemide	Aurorix
Nitrazepam	Nitrados
Nortriptyline	Norline, Nortrilen, Nortyline, Ortrip
Paroxetine	Seroxat
Perphenazine	Pernamed, Pernazine, Conazine, Porazine
Perphenazine + Amitriptyline	Anxipress-D, Neuragon-A/Neuragon-B
Phenobarbital	Gardenal, Menobarb, Phenobarbital Atlantic, Phenotal
Pinazepam	Domar
Prazepam	Pozapam, Prasepine
Prochlorperazine	Prochlorperazine
Sertraline	Zoloft
Temazepam	Euhygnos
Thioridazine	Thiomed
Tianeptine	Stablon
Tofisopam	Grandaxin
Trazodone	Desirel
Triazolam	Halcion, Trycam
Trifluoperazine	Psyrazine, Triflumed
Zolpidem hemitratrate	Stilnox
4. Anti-arthritis (การรักษาโรคข้ออักเสบ)	
Acemetacin	Aceo
Capsaicin	Capsika
Diacerein	Artrodar, Diaceric

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Glucosamine	Glutril, Athril, Osamine, Biotril-s, Coxium, Flexsa
Sodium hyaluronate	Hyalgan, Hyruan III, Ostenil
Tramadol	Amanda, Analab
Tramadol + Paracetamol	Duocetz
- NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs)	
Celecoxib	Celebrex, Celxib, Cybec, Zobrex, Painex
Diclofenac	Dosanac, Uniren Spray, Antenac, Lesflam, Cataflam, Voltaren
Etoricoxib	Exib, Eberil, Biocoxib, Icoxib, Nacoxib
Ibuprofen	Advil, Motrin, Rufen, Ambufen, Coprofen, Greatofen, Gofen, Nurofen, Bunofen, Heidi,
Meloxicam	Melox, Melcam, Mobic
Naproxen	Annoxen-S, Anaprox, Soproxen, Sonap, Naproflex
Piroxicam	Flamic, Sefdene, Piram, Roxifen
Sulindac	Clinoril, Cenlindac
Tenoxicam	Seftil, Tenax
5. Antibiotics (ยาปฏิชีวนะ) กรณีป้องกันการติดเชื้อในภาวะอื่น ๆ รวมทั้งใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ	
Amoxicillin	Amoxi T.O., Moxatag, Amoxil, Trimox, Moxilin, Ibiomox
Amoxicillin + Clavulanic acid	Cavumox, Coklav, Fleming, Amoksiklav, Amotin 1000, Augmentin, Curam
Ampicillin	Ampicillin T P, Amicilin, Ampi Frx, Medicillin, Utocillin
Ampicillin + Sulbactam	Sulam
Azithromycin	Floctil, Azithrin, Binozyt, Atozin, Meithromax, Onzet
Cefaclor	Sifaclor, Distaclor, Vercef
Cefalexin	Ibilex, Toflex, Cephin, Keflex, Farmalex
Cefepime	Cefamax, Sefpime
Cefixime	Cefspan, Sixime
Cefoperazone + Sulbactam	Sulcef, Cefper, Cebactam, Zonbactam
Cefotaxime	Claraxim, Ceforan, Claforan, Fotax
Ceftazidime	Cef-4
Ceftriaxone	Cef-3, Trixophin
Cefuroxime	Farmacef, Furoxime, Cefurim, Neurox-250

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Ciprofloxacin	Cifloxin, Ciproxyl, Ciprobay, Ciprocep, Uroxin, Cifran
Clarithromycin	Claron, Fascar, Clarith, Crixan, Klacid, Clacina
Cloxacillin	Cloxam, K-Cil, Meiclox, Cloxalin, Cloxgen
Gentamicin	Grammicin
Imipenem + Cilastatin	Sianem, Tienem, Bionem, Imcitin
Levofloxacin	Cravit, Lefloxin, Veflox, Vocin, Olfovel
Norfloxacin	Norfloxin, Norxacin, Rexacin, Sefnor
Ofloxacin	Oflocee, Ofloxin, Konovid, Viotisone
Piperacillin + Tazobactam	Peratam, Pipertaz, Tazocin, Astaz-P
Prulifloxacin	Darflox
Roxithromycin	Rothricin, Roxthrin, Coroxin, Rulid
Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Metrim, Bacin, Metxaprim
Vancomycin	Vancin-S

6. Anticoagulation agents (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด)

Apixaban	Eliquis
Dabigatran	Pradaxa
Dalteparin	Fragmin
Edoxaban	Savaysa
Enoxaparin	Clexane, Lovenox
Fondaparinux	Arixtra
Heparin	HEP-25
Rivaoxaban	Xarelto
Warfarin	Befarin, Coumadin, Jantoven, Marevan

7. Anticonvulsants (ยากันชัก)

Gabapentin	Neurontin
Lamotrigine	Lamictal
Levetiracetam	Keppra
Lorazepam	Anta, Anxira, Ativan, Lonza, Lora, Loramed, Lorapam, Lorazep, Lorazepam Macrofar, Ora, Razepam
Nitrazepam	Nitrados

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Oxcarbazepine	Trileptal
Phenobarbital	Gardenal, Menobarb, Phenobarbital Atlantic, Phenotal
Phenytoin	Dilantin, Ditoin, Ditomed, Fenitoina Rubio
Topiramate	Topamax
Valproate Na	Depakine, Valparin

8. Anti-diabetic agents (ยารักษาโรคเบาหวาน)

8.1 Insulin (ยาฉีดอินซูลิน)

Insulin, insulin aspart, insulin lispro, insulin detemir, insulin glagine, insulin glulisine	Insugen, Winsulin, Actrapid, Humulin R
--	--

8.2 Oral medication (ยาชนิดรับประทาน)

Glibenclamide	Daonil, Diabenol
Gliclazide	Beclazide MR, Diamicron, Diamexon
Glipizide	Diasef, Diapazide
Metformin	Metformin GPO, Deson, Diamet
Mitiglinide	Glufast
Pioglitazone	Actos, Gitazone
Repaglinide	Novonorm

8.3 อื่น ๆ

Exenatide	Bydureon, Byetta, Bydureon BCise
Liraglutide	Victoza, Saxenda

9. Antifungals (ยาด้านเชื้อรา)

Amphotericin B	Fungso-B, AmBisome, Amphotret, Fungso-B
Anidulafungin	Eraxis
Bifonazole	Canesten O.D.
Ciclopirox	Loprox
Clotrimazole	Canazol, Defungo, Candid, Canesten, Cotren, Chingazol
Econazole	Econ
Fluconazole	Flucozole, Flunco, Fluzoral, Diflucan, Biozole, Kyrin
Griseofulvin	Trivanex, Aofen, Fulvin, Fungivin, Grisin, K.B. Vinecin
Itraconazole	Spazol, Itracon, Spornar, Canditral, Icona

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Ketoconazole	Diazon, Funginox, Ketazon, Fungazol, Kenoral, Sporoxyl
Micafungin	Mycamine
Miconazole	Nikarin, Tara, Daktarin, Funga, Funcort, Fungisil
Nystatin	Tystatin
Posaconazole	Noxafil
Terbinafine	Lamisil, EU 2000
Tolnaftate	Ezon-T
Tolnaftate + Triacetin	Alber T
Voriconazole	Vzon200, Vanazole, VFEND

10. Anti-gout agents (ยารักษาโรคเกาต์)

Allopurinol	Alinol, Allomaron, Allopin, Alloric
Benzbromarone	Narcarcin, Benarone
Colchicine	Cochic, Colchily, Colcine, Goutichine, Tolchicine
Febuxostat	Feburic
Potassium citrate	Acalka
Potassium citrate + Sodium citrate	Pocitrin Tab
Probenecid	Bencid
Sulfinpyrazone	Sulfin
- NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs)	
Celecoxib	Celebrex, Celxib, Cybec, Zobrex, Painex
Diclofenac	Dosanac, Uniren Spray, Antenac, Lesflam, Cataflam, Voltaren
Etoricoxib	Exib, Eberil, Biocoxib, Icoxib, Nacoxib
Ibuprofen	Advil, Motrin, Rufen, Ambufen, Coprofen, Greatofen, Gofen
Meloxicam	Melox, Melcam, Mobic
Naproxen	Annoxen-S, Anaprox, Soprofen, Sonap, Naproflex
Piroxicam	Flamic, Sefdene, Piram, Roxifen
Sulindac	Clinoril, Cenlindac
Tenoxicam	Seftil, Tenax

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
11. Antihypertensive agents (ยาลดความดันโลหิต)	
Amiloride + HCTZ	Hyperretic, Moduretic, Poli-uretic
Amlodipine	Amlopine, Norvasc
Atenolol	Atenol, Coratol, Nolol, Nortelol, Oraday, Prenolol, Tenocor, Tenolol, Tenormin
Captopril	Capoten, Epsitron, Gemzil, Tensiomin
Clonidine	Carpil
Diltiazem	Alitiazem, Angizem, Cascor XL, Dilem, Dilizem, Dilzem, Ditzem, Herbesser
Doxazosin	Cardura
Enalapril	Anapril, Enam, Enapril, Enaril, Invoril, Nalopril, Naritec, Renitec
Felodipine	Felim, Felodipin Stada, Plendil
Hydralazine	Cesoline Y
Hydrochlorothiazide	Dichlotride, Dinazide, Dyazide, Dyterene, Hychlozide, Hydrozide
Lisinopril	Lispril, Zestril
Losartan+HCTZ	Fortzaar
Mannitol	Mannitol
Methyldopa	Aldomet, Dopamed, Isomed, Medopa
Metoprolol	Betaloc, Cardeloc, Melol, Metoblock, Metolol, Minax
Minoxidil	Loniten, Modil, Noxidil
Prazosin	Atodel, Lopress, Minipress
Propranolol	Atensin, Betapress, Cardenol, Inderal, Normpress, Pralol
Ramipril	Corpril, Tritace
Spironolactone	Aldactone, Altone, Hyles
12. Antimalarial agents (ยาด้านมาลาเรีย)	
Artemisinin	Alaxin, Armiquin, Artequik, Dimisinex
Atovaquone	Mepron
Chloroquine	Aralen, Malacin, Chewoquine, Nitaquin, Sinmoquin
Clindamycin	Acnocin, Rosil, Todacin, Clinott, Klinna, Klinda RX

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Doxycycline	Siadocin, Polycyclin, Doxylcap, Doxin, Madoxy
Mefloquine	Mequin, Lariam
Primaquine	PMQ, Primacip, Primax, Tpquin
Proguanil	Malanil
Pyrimethamine	Daraprim
Quinine	Genin, Alquinn
Sulfadoxine	Vinsilar
13. Antiplatelet drugs (ยาต้านเกล็ดเลือด)	
Aspirin	Asatab, Aspent-M, Aspilets, B-Aspirin
Prasugrel	Effient
Ticagrelor	Brilinta
Ticlopidine	Aplaket, Siclot, Ticlid, Ticlo, Tilopin, Tipidine, Viladil
Vorapaxar	Zontivity
14. Anti-psychotic agents (ยารักษาโรคจิตเภท)	
Clozapine	Clozaril
Diazepam	Azepam, Diano, Diapam, Diapine, Dizan, Dizepam, Sipam, Stesolid, Valium, Zopam
Fluphenazine	Deca, Pharnazine
Haloperidol	H-TAB, Haldol, Halomed, Halopol, Haricon, Haridol, Perida
Perphenazine	Pernamed, Pernazine, Conazine, Porazine
Phenytoin	Dilantin, Ditoin, Ditomed, Fenitoina Rubio
Pimozide	Orap/Orap forte, Pizide
Pinazepam	Domar
Prochlorperazine	Prochlorperazine
Quetiapine	Seroquel
Risperidone	Risperdal
Thioridazine	Thiomed
Tofisopam	Grandaxin
Trifluoperazine	Psyrazine, Triflumed
Valproate Na	Depakine, Valparin
Ziprasidone	Zeldox

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
15. Aspirin and NSAIDs ที่นอกเหนือจากการใช้ใน arthritis	
Aspirin	Actorin, Alka-Seltzer, Aspent, Aspent-M, Aspilets, Aspirin BD, Bayer Aspirin, Caparin 100, Cardiprin 100, Entrarin, Seferin-5/Seferin-10, V-AS
- NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) ที่นอกเหนือจากการใช้ใน Arthritis	
Indomethacin	Indocin, M-CIN, Indomed, Elmetacin
Ketoprofen	Orudis, Oruvail
Ketorolac	Toradol
Meclofenamate	Meclomen
Mefenamic Acid	Mefenan, Ponstan, Coly
Nabumetone	Aflex, Fafex, Naflex, Relafen
Oxaprozin	Daypro
Phenylbutazone	Butarzol, Butazone, Phenazone
16. Bronchodilators and decongestants (ยาขยายหลอดลมและยาลดอาการคัดจมูก)	
Aminophylline	Amino Patar
Bambuterol	Bambec
Ephredine	Emerphed, Akovaz, Corphedra
Naphazoline	Privine
Oxymetazoline	Feenoze, Iliadin, Metzodin, Oxymet
Phenylephrine	Sudafed PE Congestion, Neo-Synephrine, Sudogest PE, Biorphen
Phenylpropanolamine	Phenyldrine, Propan, Dexatrim, Empro
Pseudoephedrine	Sudafed, SudoGest
Salbutamol	Aerotamol, Ventolin, Sabumol, Bronchosol, Naso
Terbutaline	Asmaline, Broncholine, Tolbin, Terbu, Asthmic
Tetrahydrozoline	Tyzine Nasal, Tyzine Pediatric Nasal, Tyzine
Theophylline	Asmasolon, Nuelin SR, Theolin, Duralyn-CR
Xylometazoline	Actavia, Otrivin

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
17. Contraceptive agents (ยาคุมกำเนิด)	
Contraceptives ยาคุมกำเนิดทุกประเภท	Anamai, Anna, Contracep, Depo-gestin, Depo-progesno, Depo-progesta, Depo-provera sterile aqueous suspension, Exluton, Gynera/Gynera ED, Implanon, Jeny-FMP, Lyndiol50E, Madonna, Marvelon 21/Marvelon 28, Meliane, Mercilon 21/Mercilon 28, Medeton, Noristerat, Microgest ED, Microgynon 30 ED, Multiload CU 375 SL, Nordette-21 /Nordette-28, Norplant, Postinor 2, R-DEN, Riget 21+7, Sucee, Triquilar ED, Yasmin
18. Dermatological diseases (การรักษาโรคผิวหนัง)	
Amcinonide	Visderm
Betamethasone	Betosone, Besone, Betnovate, Bepronate
Ciclosporin	Cipol-N, Equoral, Sandimmun, Kasporin
Clobetasol	Clonovate, Clinoderm, P-Vate, Dergemate
Dexpanthenol	Bepanthen
Hydrocortisone	Hytisone, H-Cort, Efficort
Mometasone	Momate Cream, Elomet
Mupirocin	Muporin, Bacidal, Macroban, Supirocin
Nitrofuraf	Densa
Pimecrolimus	Elidel
Prednisolone	Clinipred
Silver sulfadiazine	Silverderm, Dermazin
Tacrolimus	Advagraf, Prograf
Tranexamic acid	Transamin, Lysteda, Cyklokapron
Triamcinolone Acetonide	Ftorocort, Kela, Kelamild, Kemzid, Simacort Cream
Ubidecarenone	Sebamed
Urea	DiabeDerm, Ureaten, UO Cream, Nutraplus
Zinc oxide	Nappy-Hippo, Sam-Ko

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
19. Dieting (ควบคุมอาหาร)	
Weight reduction pills	
Orlistat	Xenical
Phentermine	Panbesy
Sibutramine	Reductil
20. Eye preparations (ยาตา)	
Atropine	Atroren-P, Isopto atropine
Benzalkonium chloride + Tobramycin	DW Tobramycin
Chloramphenicol	Chloroph, Cogetine, Silmycetin
Cyclopentolate	Cyclogyl
Dexamethasone + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline	CD-Oph
Dexamethasone + Neomycin	Archidex, Eyedex, Dexoph, Dexylin, Cadexcin-N
Dexamethasone + Neomycin + Polymyxin B	Maxitrol
For Allergic conjunctivitis (ตาอักเสบจากการแพ้)	Hista-Oph, Allergis, Flu Oph
Fusidic acid	Fucithalamic
Loteprednol	Alrex, Lotemax
Loteprednol etabonate + Tobramycin	Zylet
Moxifloxacin	Svoz, Cravit, Vigamox
Moxifloxacin	Vigamox
Prostaglandin analogues ได้แก่ Bimatoprost, Latanoprost	Prosdrop, Lanotan, Lumoprost, Lumigan, Ganfort, IZBA, Duotrav BAK-free, Travatan
Timolol	Glauco-Oph
Tobramycin	Tobrex
Topiramide	Mydriacyl
น้ำตาเทียม (artificial tears)	Lac-Oph, Natear UD, Seeview sofs

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
21. Gastrointestinal medications (ยาที่ใช้ในโรกระบบทางเดินอาหาร)	
Aescin	Reparil-Dragees
Antacids ยาลดกรด	Algycon, Alum gel, Belcid, Silomed, Ziga
Benzocaine + Hydrocortisone acetate + Zinc oxide	Doproct
Diosmin + Hesperidin	Daflon, Dafomin, Diosmin, Meslon, Flavon
Fluocortolone pivalate + Lidocaine hydrochloride	Scheriproct N
Histamine 2-Receptor Antagonists (H2RAs) ได้แก่ Cimetidine, Ranitidine, Famotidine	Ulcemet, Cigamet, Siamidine, Ranidine, Acicare, Ranicid, Pepfamin, Ulceran, Famopac
Prokinetic agents เช่น Domperidone, Metroclopramide	Motilium, Peridom-M, Avomit, Plasil, Maril
Proton Pump Inhibitors: PPIs ได้แก่ Omeprazole, Rabeprazole, Pantoprazole	Miracid, Prazole, Desec, Omicap, O-Sid, Gaster, Eucid, Gomec, Stomec, Ulpracid
สำหรับอาการท้องเสีย (diarrhea)	Besmal, Bioflor, Dehecta, Lomide, Impilium, Carbon, Smecta, Charcoal, Disento, Imodium
สำหรับอาการท้องผูก (constipation)	Mucilin, Milk of Magnesia, Senokot, Dulcolax, Hepalac, Bisacod, Bisacodyl, Emulax, Senna
22. Hair loss treatment medicines (ยารักษาโรคผมร่วงและผมบาง)	
Dutasteride	Avodart, Uroka, Dueride, Duagen
Finasteride	Propecia, Proscar, Benstat, Firide
Minoxidil	Midil, Regrowth, Nuhair, MI-X, Reten, Loniten
23. Heart disease and medications (โรคหัวใจและยารักษาโรคหัวใจ)	
Abciximab	ReoPro
Digoxin	Toloxin, Cardial, Grexin, Lanoxin
Ivabradine	Coralan
Nicorandil	Ikorel, Angedil

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Nitrates ได้แก่ Isosorbide dinitrate/mononitrate	Hartsorb, Corodil, Isobinate, Imdex, Monosorb, Sorbinate, Solotrater, Monolin
Ranolazine	Ranexa
Thrombin Inhibitors เช่น Argatroban, Bivalirudin	Acova, Angiomax
Tirofiban	Aggrastat
Tolvaptan	Samsca, Jynarque
Trimetazidine	Matenol, Vastarel, Vastinol, Metagem, Trizidine

ดูเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 6. Anticoagulation agents, 11. Antihypertensive agents และ 13. Antiplatelet

24. HIV prevention regimen (ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ PrEP และ PEP)

PrEP, PEP

-

25. Hormones (ฮอร์โมน)

Aminoglutethimide	Elipten, Cytadren, Orimeten
Growth Hormone	Genotropin, Norditropin, Humatrope, Norditropin FlexPro
Hormone Replacement Therapy (HRT)	Alora, Cenestin, Fentrace, Ogen, Prometrium, Provera, Femhrt, Prefest, Activella, Angeliq, Prempro, Duavee
Testosterone replacement therapy (TRT)	Aveed, Depo-Testosterone, Delatestryl, Testopel

26. Immunization (วัคซีน)

Chicken Pox (varicella)	Varivax
Cholera	Metacol Berna (oral)
Diarrhea (traveller's)	Dukoral (oral)
Diphtheria, Tetanus, Pertussis	Adacel, Boostrix
Encephalitis, Japanese	Ixiaro
Hepatitis A	Avaxim, Epaxal, Havrix, Vaqta, Vivaxim
Hepatitis A and Hepatitis B	Twinrix
Hepatitis B	Engerix B, Recombivax-HB
Herpes Zoster (Shingles)	Shingrix, Zostavax
Human Papillomavirus	Gardasil, Cervarix
Influenza	Fluviral, Influvac, Arepanrix (H1N1), Panvax (H1N1), Vaxigrip, Agriflu, Intanza, Flumist intranasal

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Measles, Mumps, Rubella	MMR
Measles, Mumps, Rubella, varicella	MMRV
Meningococcal	Meningitec, Menjugate, Menactra, Menveo, Nimenrix, Bexsero
Mumps	MMR
Pneumococcal	Pneumovax, Prevnar, Pneumo 23
Polio	Salk, Imovax, IPV (injection), Sabin (oral)
Rabies (post-exposure immunization)	Rabies Immune Globulin
Rabies (pre-exposure immunization)	RabAvert
Rubella (German measles)	MMR
Tick Borne Encephalitis	FSME-IMMUN
Typhoid	Vivotif (oral), Typherix, Typhim Vi
Typhoid, Hepatitis A	Vivaxim
27. Lipid lowering agents (ยาลดไขมันในเลือด)	
Acipimox	Olbetam
Atrovastatin	Crestor, Lipitor
Bezafibrate	Bezalip Retard, Bezamil, Polyzalip
Cholestyramine	Questran Light, Resincolestiramina
Fenofibrate	Lexemin, Lipanthyl/Lipanthyl 200 M, Supralip 160
Fluvastatin	Lescol/Lescol XL
Gemfibrozil	Bisil/Bisil 600, Deopid, Dropid, Gemfibril, Gemfibrozil, Gozid, Hidil, Lipidys, Lipison, Lipolo, Lipozil, Locholes, Lopid/Lopid OD, Manobrozil, Mariston, Norpid, Pharzil, Poli-Fibrozil, Polyxit, Tiba
Nicotinic acid	Nicotabs
Pravastatin	Mevalotin, Mevalotin Protect
Simvastatin	Bestatin, Eucor, Lochol, Simvor, Torio, Vascor, Zimmex

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
28. Mild analgesics and muscle relaxants (ยาแก้ปวดมีฤทธิ์อ่อนและยาคลายกล้ามเนื้อ)	
Eperisone	Espenal, Musolax, Myonal, Ralexia
Paracetamol	Acetasil, Algogen, A-MOL, Biogesic, Calpol/Calpol PED, Cemol, Daga, KIT-Syrup, Lotemp, Mypara, Panadol, Paracap, Paracet, Paramol, Parat, Paratol, Partamol, Pemol, Pyracon, Pyretal, Ramol, Tumdi, Tylenol, Tymol, Unimol, Xebramol
Paracetamol + Orphenadrine	Dorpane, Medgesic, Muscol, Myodrine, Myoflex, Myosic, Myospa, Nabesac, Neosec, Norphen, Nurasic, Orlex, Orpar, Orphengesic, Poli-Relaxane, Polydol, Relar, Rena,
Tolperisone HCl	Biocalm, Musocalm, Mydocalm, Mydono, Mydosone, Myoxan, Risocalm, ShiwalaxSoneriper/Soneriper S, Tanderon,
29. Steroids (สเตียรอยด์)	
Bethamethasone	Celestone
Budesonide	Pulmicort
Dexamethasone	Dexamethasone Intensol, DexPak
Fludrocortisone	Florinef
Fluticasone	Flovent, Arnuity Ellipta
Hydrocortisone	Cortef
Methylprednisolone	Medrol, Depo-Medrol, Solu-Medrol
Prednisolone	Orapred, Prelone
Prednisone	Prednisone Intensol
Triamcinolone	Aristospan Intra-Articular, Aristospan Intralesional, Kenalog
30. Vitamins and dietary supplements (วิตามินและอาหารเสริมต่าง ๆ)	
Fish oil และขมิ้นชัน (Curcumin)	-
Glucosamine Sulfate	Viartril-S, Coxium, Glucosa, Kosamine, Glutril
Vitamins	-
อาหารเสริม ยกเว้น Fish oil และขมิ้นชัน	-
อาหารเสริมลดน้ำหนักประเภท	-
L-carnitine	

ชื่อสามัญ (Generic name)	ชื่อการค้า (Trade name)
อาหารเสริมอื่น ๆ เช่น กลูต้าไธโอน ชนิดรับประทาน คอลลาเจนชนิด รับประทาน สารสกัดคลอโรฟิลล์	-
31. Others (อื่น ๆ)	
31.1 การเสริมความงาม	
-	-
31.2 Methylphenidate	Concerta, Ritalin, Methylphenidate Hexal, Rubiten